


6

TENTAMEN MEDICUM

INAUGURALE,

DE

APOPLEXIA.



TENTAMEN MEDICUM
INAUGURALE,
DE

APOPLEXIA,

QUOD,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GEORGII BAIRD, S.S. T.P.

ACADEMIAE EDINBURGENAE PRAEFECTI.

NECNON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI Consensu,
Et Nobilissimae FACULTATIS MEDICAE Decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT


ALEXANDER MELVILLE,
SCOTUS;

SOC. REG. PHYS. EDIN. SOC.

AD DIEM 12 SEPTEMBERIS, HORA LOCOQUE SOLITIS.

EDINBURGI,
CUM PRIVILEGIO,
APUD ROBERTUM ALLAN.

MDCXCVII.



PATRI OPTIMO,

ANDREÆ MELVILLE,

DE


HALLFIELD, ARMIGERO,


HAS


STUDIORUM PRIMITIAS,

CONSECRAT

FILIUS.







TENTAMEN MEDICUM

INAUGURALE,

DE

APOPLEXIA.

AUCTORE, ALEXANDRO MELVILLE.

UTPOTE gradu tantum a paralyfi apoplexia discrepat, dissertationis plenæ argumentum minus aptum videatur; istas igitur affectiones tanquam diversa ejusdem morbi stadia, aut varietates, habebimus: quia hac ratione historia erit magis per-

A

fecta;

fecta; et morbo veniente occurrendi consilia evidentiora fient.

Apoplexiam strictiùs ita dictam, CULLENUS nosologus, modo sequente definit:—

“ Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum
 “ sopore, plus minus profundo, superstito motu
 “ cordis et arteriarum.”

Et sic paralyfin :

“ Motus voluntarii nonnulli tantum imminuti,
 “ sæpe cum sopore *.”

Cùm autem nulla definitio cuncta morbi phænomena complecti queat, historiam ejusdem pleniorẽ tradere conabimur.

SECT.

* Vid. CULL. *Synops. Nosolog. Method.* Tom. II. Gen. XLII et XLIII.

S E C T. I.

De Phænomenis.

HISTORIA medica, ob diversas, quas morbus induit, species, difficultate haud parva premitur : modo enim apoplexiæ, omnibus suis numeris absolutæ, formâ, impetum derepentè facit ; modo autem cum signis paralyseos plus minus generalis et distinctæ nervis tardè obrepit, donec tandem causâ excitante graviore, sed ejusdem generis ac illa, quæ primæ affectioni originem dedit, superveniente, subito ad summum inveterationis suæ gradum, perfectam nimirum sensus et motus *voluntarii* imminutionem, vel ad minorem tantum, hemiplegiam scilicet, exurgit.

Posito morbum posteriori forma, hoc est, tardè incipere, varia diversorum stadiorum signa enumerare aggrediar.

Hebetudo, torpor, et subinde vertigo, nec non capitis dolor modò subito obortus, modò tardè et paulatim obrepens, sunt inter prima signa, quæ se ostendunt. Somnolentia morbum formidolosiorum haud raro prægreditur : et interdum menses, immo annos, ante paroxysmum perstat.

Cordis et arteriarum actio nonnunquam paululum augetur : et sudores in fronte prorumpunt : tinnitus aurium interdum, et, quod huic affine est, fugax audiendi gravitas, adsunt. Visus quoque sæpe minuitur, vel prorsus, ad tempus, aboletur : alia porro oculi vitia haud raro se ostendunt, unus enim, aut ambo rubescunt : jamque suffusio, aut muscæ volitantes, vel strabismus visus duplicis phænomena plus minus exhibens, plerumque adsunt.

Præter hæc multarum aliarum corporis partium, veluti digitorum, &c. paralysis astat : ægerque, inter expergiscendum, alterius corporis lateris torporem

porem nonnunquam sentit ; hoc autem levioris potius paroxysmi effectus, quam prodromus habendum videtur *. Loquendi organa pariter afficiuntur ; lingua titubat ; nec verba amplius distinctè efferuntur.

Nec minus læduntur sensus interni : memoria insignitè minuitur : hujus autem vitii plures sunt varietates, quibus non minus physicos quam *metaphysicos* studere oportet.

Aliàs memoria longè aliter se habet : modo enim res ipsæ, ex animo penitus effluunt, dum nominum recordatio intacta manet : hoc celeberrimus GREGORY in prælectionibus suis illustrat ; exemplum narrat insigne mulieris, quæ, licet rerum nomina in memoriam revocare potuerit, se tamen filioli sui matrem fuisse oblita est. Contrà ægrorum exempla non defunt, qui, ut Van. SWIETEN scribit, “ Non possunt vera rebus designandis vocabula
“ inve-

* GREG. Prælect.

“ invenire ; manibus, pedibus, totius corporis nixu
 “ conabantur explicare miseri quid vellent, nec
 “ poterant tamen.”

Artuum tremores sæpe adfunt ; incubus et insomnia horribilia hujusmodi affectiones comitantur ; sanguis ex naribus sæpe erumpit ; nausea et vomitione non raro adstantibus.

Postquam hæc signa per aliquod tempus plus minus gravia perstiterint, æger subito, quasi fulmine tactus, apoplexia propriè nunc dictâ vel hemephlegia corripitur : hoc quoque interdum, nullis signis antecedentibus evenit :

Ac velut in somnis, oculos ubi languida preffit
 Nocte quies, necquiquam avidos extendere cursus
 Velle videmur, et in mediis conatibus ægri
 Succidimus ; non lingua valet, non corpore notæ
 Sufficiunt vires, nec vox aut verba sequuntur.

VIRG.

Morbi, sive nullo monito prævio, sive post signorum

rum feriem supra memoratorum, impetum fecerit, historia est admodum varia : modò enim signa sunt eadem ac illa quæ definitio complectitur ; modò autem concursu et gradu infinitè fere variantur : sopor enim adeo est nonnunquam imo fere semper, profundus, ut sensus externi, licet stimuli validissimi admoveantur, functionibus suis peragendis prorsus impares evadant ; ita ut lux et strepitus parùm vel nihil valeant ; hoc autem non est perpetuum ; dantur enim exempla, in quibus ægri vident, audiunt, et tactu percipiunt.

Motus voluntarii, quoque muscoli non minus quam organa sensuum afficiuntur ; flaccidi et sine sensu existunt, ne quidem *cauterio actuali* excitandi : hic autem mobilitatis defectus gradu multum variat ; in nonnullis enim casibus, acerbis admotis, solito more cientur.

Spiritus est plerumque difficilis, frequens, abnormis, et sæpe rhoncho concitatur ; hoc autem signum
maxi-

maximâ ex parte fortuitum est ; minimèque morbi violentiam notat.

Convulsiones sunt sæpe generales ac validæ : interdum verò quasdam tantum corporis partes afficiunt, levesque existunt : ita ut iris sola nonnunquam patiatur.

In quibusdam casibus alterum corporis latus convulsionibus laborat ; altero simul paralyfi affecto.

Arteriarum pulsus sunt admodum varii ; plerumque autem, ineunte morbo, paulatim se submitunt ; nec raro denuo validiores ac frequentiores futuri. Dr SPENS exemplum narrat, in quo pulsus ad 9 usque descenderit * ; qui casus omnium memoriæ proditorum tardissimus est : nonnunquam penitus deficit ; et brevi iterum viget, et supra normam naturalem ascendit ; plerumque est
vali-

* DUNCAN's Medical Commentaries 1793.

validus : modò verò præter naturam debilis existit:

Faciei color est admodum varius, modò purpureus, modò niger Æthiopis vultum referens; nec contra defunt multa exempla quibus color erat naturalis. Oculi sunt sæpe rubri, turgidi, semiaperti, ac vitrei, cum pupillis nonnunquam ampliatis *. Musculi oris, quod non sine magna difficultate aperiri potest, spasminis afficiuntur. Colli venæ turgidæ fiunt; et arteriarum carotidum pulsus nonnunquam clare etiam ad insignem distantiam conspici possunt, cujus rei exemplum notabile in hujus urbis noscomio nuper vidi.

Devorandi vis vel minuitur, vel penitus deletur, et lingua paralyfi corripitur: urina modò prorsus supprimitur; modò præter voluntatem elabitur; sudor aliàs tenuis, aliàs viscidus ac gelidus prorumpit, et lymphæ aut sanguis ex naribus, ore,

B

auri-

* JUNCKERUS, pag. 900, de Signis Apoplexiæ.

auribus, aliave, qua data porta, via, profunditur.

Morbo funesto evasuro, signa cursum magis stabilem ac fixum legunt : spirandi difficultas magis magisque ingravescit, donec tandem thoracis motus vix percipi potest ; arteriarum ictus frequentiores ac debiliores fiunt, et demum intermittunt, vel penitus cessant ; spuma ex ore fluit : totum corpus gelido sudore diffluit, ægerque tandem animam efflat.

Apoplexia autem exquisitior non hoc modo semper infaustè terminatur : frequentius enim in hemiplegiam definit : ægerque vitam miserrimam trahit ; donec alter, tertiusve impetus miseriæ finem imponat. Quando hæc morbi forma ægrum adoritur, ponderis in latere affecto, et interdum stuporis, sed raro doloris, sensus, percipitur. Arteriæ initio frequentes plerumque micant ; postea autem pulsus minuitur ; et interdum, licet
hoc

hoc admodum raro evenit, penitus ad tempus cessat, brevi iterum excitandus. Alvus plerumque comprimitur; in quibusdam exemplis sudor viscidus in parte affecta observatur; et nonnunquam in totum corpus diffunditur *. Cutis est sæpe arida, et interdum, admodum autem raro, latus paralyfi non affectum convulsionibus corripitur †.

Interea muscoli faciei et oris lateris affecti deorsum trahuntur; et lingua, quando exferitur, latus affectum versus pellitur ‡, functionibusque suis peragendis omnino impar evadit. Formicatio molesta sensum, qui, nervo pressio, exoritur, simulans, ægrum vexat; et in parte affecta sensus quasi insectorum super eandem repentium sæpe percipitur. Tremores quoque ægrum admodum sæpe, et diræ

B 2

con-

* HIPPOCRATES. Epid. p. 766.

† HOFFMANN. Syst. Rat. Tom. IV. p. 27.

‡ GREGORY. Prælect. Clin.

convulsiones agitant *. Et postquam morbus diu perstitit, partes affectæ macie conficiuntur, et muscoli plerumque rigidi fiunt †.

Tactus plus minus afficitur, non tamen penitus aboletur : plerumque autem nullam læsionem insignem patitur. Professor GREGORY exemplum narrat philosophorum et medicorum attentione dignum, in quo alterius lateris motus, sensu tactus illæso perstante, penitus abolutus erat, dum simul lateris contrarii sensus, mobilitate integra manente, omnino perditus reperiiebatur ; adeo ut, stimulantibus lateri paralyti affecto admotis, nullus sensus excitaretur ; iisdem autem partibus ultra medias vertebrae applicatis, sensus more solito illico cieretur.

Morbus in hoc stadio in mortem interdum definit : sæpius autem apoplexia iterum iterumque supervenit, ægrumque tandem rapit : et etiam in casibus, in quibus morbus hanc proclivitatem infau-

* SENAC. de la Structure du Cœur.

† De HAEN de Hemiplegia, p. 31.

faustam non ostendit, paroxysmi reditus semper timendus est ; quia partes vim morbi delettricem semel passæ vigorem pristinum rarissimè recuperant ; et lugenda animi debilitas semper superest ; “ Sic
“ ut viderim,” inquit illustris Van SWIETEN, “ sapientissimis antea viris, et fortissimis militibus
“ masculum illud animi robur adeo fuisse enervatum, ut, flebilis pueri instar, ob lævissimam causam in lachrymas solvantur *.”

SECT.

* Prælect. Vol. II. p. 659.

S E C T. II.

De Causis Remotis.

HÆ in duas species dividendæ sunt ; in istas nimirum quæ homines obnoxios reddunt, et quæ in jam obnoxiiis morbum concitant. Illæ, linguâ medicorum *prædisponentes*, hæ *excitantes* sive *occasionales* dicuntur.

De Prædisponentibus.

NATURAM certam ac definitam sanguinis copiam cursu æquabile et constante ad cerebrum mittere, non solum ex figura et structura cranii foraminum per quæ vasa sanguinem vehentia transeunt, sed etiam ex vasorum ipsorum cranium jam ingressorum fabrica, et cursu sinuoso, et commercio, summa

ma cura voluisse patet. Ex hac miranda fabrica hunc æquabilem sanguinis cursum ac copiam consilio cuidam utilissimo in œconomia animalium interfervire colligere fas est: necnon sensorii functiones, et diversos machinæ motus ex eodem artificio magna ex parte pendere, nobis verisimile videtur.

Quando causæ agunt quæ cursum sanguinis abnormem caput versus faciunt, morbus, interdum, frustra repugnante naturâ, concitatur: quædam enim corporis conditiones, vel ex fabrica congenita, vel ex vitio, progrediente vitâ, collecto, naturæ consilio haud parum adversantur; et sic corpus morbo multo opportunius, quam solitis rebus circumstantibus, reddunt. Hæ corporis conditiones sunt præsertim, ætas ingravescens; caput magnum; collum breve; obesitas; nimia corporis plenitudo; et ebrietas frequens. Harum rationem nunc ordine reddere conabor:

Ætas ingravescens.—Malum de quo agitur primam

mam raro adoritur ætatem ; plerumque enim tempore quod annum quadragessimum inter et summam senectutem labitur, occidere solet : quamvisque res nonnunquam aliter se habuerit, hoc tamen nihil de lege generali derogat.

Quare ætas provecta huic malo præ juniore, opportuna existit, ex periculis Doctoris WINTRINGHAM, me saltem iudice, exponi potest : ex his enim arterias, si venis componantur, majorem, progrediente vita, rigiditatem acquirere constat ; hinc sanguis solito majore copia in venas propellitur : et hæ distenduntur, et tonum majorem artiarum rigiditati æquandæ parem adipiscuntur : si autem ultra modum distendantur, tantum aberit ut vires, pro rata distensione, majores adipiscantur, ut etiam, cæterarum partium musculosarum instar, insigniter præter naturam infirmentur ; et distensione adhuc majore adhibitâ, paralyfi demum afficiantur ; qui quidem effectus in omnibus partibus musculosis, ultra

ultra modum distentis, ex quadam œconomix animalis lege in universum oriuntur.

Et fane venas in ætate provectis summum prope modum tonum ob distentionem, quam, progrediente vitâ patiuntur, adipisci verisimile videbitur : hinc si cordis et arteriarum actio ex quavis causa augeatur, venæ ulterius distendentur : et tonum suum partim amittent, ita ut sanguinis cursus per easdem impeditus, aut saltem tardatus, reditui ejusdem in arterias faveat ; et hinc apoplexiæ impetum facile concitet ; eoque facilius hunc effectum edat, quod capitis, præ cæterarum corporis partium arteriæ, in ætate provectis rigidæ, ac fragiles, existunt.

Caput magnum haud parum huic morbo favere nemo sanus negaverit : et licet variæ expositiones elaboratæ et tanquam elucubratæ a variis auctoribus prolatae fuerint, rei tamen pathologia atrâ adhuc caligine mergitur : VAN SWIETEN

caput magnum necessarium colli brevioris effectum opinatur ; et hinc, ipso iudice, ratio facile redditur, quare caput magnum homines apoplexiæ opportunos reddit : hæc autem rei enodatio minime, ut mihi videtur, admittenda est : sæpe enim colla longa capitibus magnis instructa videmus. Hunc nodum, non sine magna difficultate sequenti ratione solvere audemus.

Sanguinis circuitus intra cranium, situ corporis erecto, alii paret naturæ legi, præter has, quibus in cæteris corporis partibus absolvitur, ponderi nimirum æëris atmospherici arterias carotides extra cranium, non autem intra prementis : hoc posito, cum venæ sunt arteriis longiores : ex principiis hydraulicis easdem, ad sanguinem per partes cranii internas, situ corporis erecto, nulla vi cordis aut arteriarum adjuvante, vehendum valere manifestum est.

Cum autem hæc vis, tandem erecto corporis situ, sanguini reducendo inservit, neque impulsu

sum

sum necessarium impertit; causas, quæ sanguinis cursum in cæteris corporis partibus absolvunt eidem superadditas invenimus: hoc autem de arteriis solis verum est: venæ enim tuborum metallicorum instar, actioni inhabiles existunt: sanguis igitur per easdem partim vi *hydrostatica* supra memorata, et partim vi a tergo vehatur oportet: et hinc patet, quo longior est circuitus venarum, eo majore arteriarum vi opus esse ad sanguinem cum justo impetu per sinus propellandum. Multae autem res in capite præter naturam magno reddunt vim, quam arteriæ sanguini impertiunt, minorem renixu, quem venæ et sinus eidem opponunt: ob majorem enim arteriarum longitudinem in capitibus magnis, vis quam cor dat, magis subigitur, antequam sanguis ad venarum initia pervenerit; hincque vis a tergo in capite præter naturam magno erit præter solitum parva: quamvis ob majorem finuum longitudinem, et præsertim ob curvaturas eorundem majores, majori arteriarum vi opus est, quam in ex-

emplis ordinariis. Hic igitur renixus, quem major finium longitudo, et curvaturæ eorundem profundiores vi a tergo opponunt, reditui sanguinis arterias versus favebit, quod harum actionem augebit; et rebus circumstantibus secundis, effusionem efficiet: quamam vero ratione hæc apoplexiam excitat, exponemus, ubi de causa proxima agetur.

Collum breve.---Vis circuitus sanguinis in partibus prope cor sitis est major quam in remotioribus: hinc manifestum est, quibus collum est brevius, iis cerebrum, vi sanguinis circuitus auctâ, multo magis præter solitum pressum iri, quam his, qui collo longiori instructi sunt: illisque apoplexiam, aut paralyfin, causa excitante agente, facile concitari posse, dum hi eisdem rebus circumstantibus, ab his malis immunes evaderent.

Obesitas.---HIPPOCRATES ipse graciles diutius quam obesos vivere observavit; multi quidem enumerari

merari possent morbi, qui obesitatem causam suam agnoscunt : nulli autem, qui originem suam ex gracili ac macilento corporis habitu ducunt. Textus cellulosus cutem inter et musculos, et omentum, sunt precipuæ adipis sedes ; qui evidentur efficit, ut sanguis interiores corporis partes, cerebrum nimirum, pulmonem, ceteraque viscera versus pellatur ; vasa enim quæ per telam cellulosam transeunt, adipe premantur oportet ; hinc sanguinis per eandem transitus difficilior fiet ; et halitus cuticularis suppressio, et abnormis sanguinis distributio interiora versus subsequenter. Porro tota tela cellulosa adipe distenta, et omentum omnia vasa vicina compriment ; et hoc modo ad eundem effectum præstandum laud parum conferent. Quanam ratione internarum partium plenitudo proclivitatem in apoplexiam facit, satis jam patet.

Nimia corporis plenitudo.---Hæc inter causas prædisponentes primum fere locum tenet : præcipue

cipue hujus vitii causæ sunt exinanitionum solitarum suppressio ; hæmorrhagiæ five sponte, five arte fiant ; ignarum vitæ genus ; et diæta plenior.

Ratio, qua pleræque harum causarum corporis plenitudinem efficiunt, adeo manifesta est, ut nulla expositione indigeat. Hæmorrhagiæ plenitudini, vires arteriarum extremarum minuendo favere videntur : his enim magna sanguinis jacturâ debilibus, excretiones omnes languide perficiuntur ; hinc egesta pro rata parte minora fient ; et nimia humorum copia brevi congeretur.

Ebrietas frequens ultima harum causarum, duplici ratione agere videtur : vim enim cordis et arteriarum ultra modum auget ; et inordinatum sanguinis cursum sæpius caput versus faciendo, vasa proclivitatem ad actionem istam inordinatam præter naturam acquirunt, quod hominem apoplexiæ, causis occasionalibus. etiam levibus admotis, obnoxiam reddit.

De Occasionalibus.

MORBUS nonnunquam adeo derepente impetum facit, et res circumstantes sunt adeo obscuræ, ut nulla causa occasionalis percipi possit ; interdum vero hæ causæ fatis manifestæ fiunt. Et precipuæ esse videntur exercitatio corporis vehemens ; tussis et sternutatio ; animi affectiones ; calor externus ; balneum calidum ; ebrietas ; crapula ; quivis corporis situs, qui cursui sanguinis per arterias in caput favet, reditumve ejusdem per venas impedit ; ligaturæ circa collum ; cervix subito, vel diu rotata ; cœli temperies et varietates ; et polypi circa cor ; de quibus paucula ordine jam dicemus.

Exercitatio corporis vehemens.---Justa musculorum actio sanguinis circuitui necessaria est, vehementior autem sanguinem solito majore vi et copia ad partes corporis interiores, qua quippe sanguis

guinis impetui minus resistitur, impellit. Hoc docet pallor qui musculo se contrahenti semper supervenit; quod manifestè pendet ex sanguinis quantitate, quam musculus amisit, quæque necessario ad partes internas utpote minus renitentes defertur; cumque cerebrum cranio defensum, omnium partium, pressurâ maxime immune existit; sanguis ibidem facilius quam alibi corporis accumulabitur: præterea pressus quem ipsi artieriarum trunci, musculis, inter contrahendum, tumentibus, patiuntur, haud parum ad hunc effectum edendum confert. Porro in omninifui corporis vehementiori inspiratio plena ac profunda semper fit, quæ non solum sanguinis reditum a capite impedit, sed etiam eundem per arterias carotides insigni vi ad cerebrum mittit: ob pressuram enim quam pulmo, aëre jam præter solitum distentus, venis sanguinem ex eodem reducentibus infert, sanguis insigni velocitate in auriculam cordis finistram feratur: nec desunt exempla hominum quibus ex hac causa sanguis ex faciei

ciei vasculis prorupit, et similis sanguinis fluxus in vasis internis, similisque arteriarum ruptura facile concipi possunt. Ad hoc caput referri possunt omnes pulmones nifus, sive hi loquela vehementiore, cantu, aut instrumentorum musicorum inflatu fiant. Vis insignis quâ cantus ad hunc morbum concitandum valet, exemplum nobis VAN SWIETEN tradidit. Celeberrima cantatrix VINDOBONAE quoties tonos quosdam canere conaretur, vertigine corripiebatur, facies turgescibat, et rubore suffundebatur: hincque suum vitæ institutum relinquere coacta fuit.*

Tussis et Sternutatio.---Hæ violentiores corporis agitationes haud raro apoplexiam concitarent: tussi vehementiore facies statim rubore suffunditur, sanguinisque motus præter solitum intenditur; quod omnes fere norunt. Eruditus GREGORY exemplum in suis prælectionibus nar-

D

rat,

* Comment. Aph. 1010. 38.

rat, quod huic rei plus luminis, quam quodvis ratiocinium offundit puero, qui pertussi laborabat, sanguinis fluxus caput versus tantus existerat, ut oculi ob sanguinis in tunica adnata congestionem lignum quod Anglice *Mahogany* nuncupatur, colore referrent. Risus vel fletus eundem effectum interdum edere potuerint.

Animi affectiones.---Animi motus, qui huic effectui præstando pares inveniuntur, sunt præsertim illi qui excitantes appellantur; inter hos præcipue eminet ira, quæ in signi quidem actionis cordis et arteriarum et præcipue capitis vasorum excitandæ vi pollet: excandescenti facies rubore iræ indice subito suffunditur; consimilis sanguinis impetus in vasis cerebri oboriens apoplexiæ, ut facile concipi potest, haud raro ansam præbebit: nervorum insuper distentio sæpe ex abnormi hoc animi effectui exoritur; quod insigniter docet quantâ vi ira in sensorio et nervis pollet.

Calor

Calor externus.---Vix hic loci memorare opus est quanta vi calor in totum genus vasculorum agit, quamque facile hunc morbum excitat, præsertim si cum aëre corrupto, ubi plures simul congregantur, jungatur: ante focum luculentum sedentibus status minioſi apoplexiæ similis obrepit; nec etiam optima sanitate utentes huic causæ objecti languore ac somnolentia immunes evaserint.

Balneum tepidum.---Hujus effectus partim ex caloris stimulo, ut supra jam exposuimus, et partim ex toto genere nervoso laxato, aut soluto, pendent: nec defunt exempla hydropicorum, qui tepidario immerſi apoplexiâ correpti subito corruerunt.

Ebrietas.---Hanc causis apoplexiæ prædisponentibus supra jam annumeravimus; nec eadem rarius causa morbi excitans existit: et sane ebrietas ipsa est corporis et animi status apoplexiæ

plexiæ haud abfimilis; nec utriusque conditionis causæ aliter quam gradu solo discrepare mihi videntur: aucta vaforum sanguinem ad cerebrum vehentium actio ex faciei rubore et plenitudinis in capite sensu manifeste patet: et hæc apoplexiæ varietas potius ex pressu, quem aucta vaforum actio cerebro infert, quam ex effusione pendere videtur.

Crapula.---Nulla causa cognoscitur, quæ apoplexiam sæpius quam crapula excitat.

“ Ense cadunt multi, perimit sed crapula plures,

“ Hinc subitæ mortes, atque intestata senectus.”

Nec hoc satyricum sagacis HOGARTH peniculum fugere potuit. Hujus effectus, pariter ac somnolentiæ, quæ ingurgitationi supervenit, nonnulli rationem ex ventriculo ultra modum distento aortam comprimente petere solent: parum autem evidens est, talem effectum hac ratione fieri posse,

ni ventriculus immanè distendatur; eadem quippe somnolentia animalibus, quæ nullam habent aortam post cibum copiose sumptum obrepit; ex pressura igitur aortæ illata, vix, aut ne vix quidem, pendere potest.

Quivis corporis situs, qui cursui sanguinis per arterias in caput favet, reditumve ejusdem per venas impedit.---His causis annumerari debent corporis inclinatio, et decubitus cum capite præter solitum humili; tantus est primæ harum causarum effectus, ut nonnullis inter corpus inclinandum memoria penitus deficiat: talium autem fituum effectus ex consuetudine plurimum pendet.

Ligaturæ circa collum.---Hæ venas plus quam arterias, propter illarum situm compriment, quod sanguinis cursum arterias versus repellendo morbum nonnunquam concitaverit.

Cervix subito, vel diu rotata.---Hæc res a Doctore FOTHERGILL memorata quibusdam argutiola forsan videbitur : minime tamen negligenda est : quo brevior fuerit ægri cervix eo major erit effectus : venæ enim jugulares breviores majorem distentionem quam longiores capitis rotatione patiuntur.

Cæli temperies et varietas---Hæc affectio quibusdam annis, et tempestatibus, præ cæteris adeo frequens existit ; ut a quibusdam pro morbo per populum grassante habita fuerit. Hoc cæli temperiei subito, veluti ex frigida in calidam, mutatæ tribuendum videtur : hinc morbus frequentiùs vere, quam quavis alia anni tempestate se ostendit. Systemate vasculoso exquisitius librato, sanguinis distributio abnormis stimulo caloris externi caput versus fieri potest : et hoc modo morbus ex hac causa oritur verisimile est.

Polypi circa cor.---Quamvis pleræque harum concretionum, quæ tam sæpe in corde partibusque eidem vicinis reperiuntur, post mortem formantur; nonnunquam tamen in corpore vivo existunt, variisque, non solum capitis, sed etiam aliarum corporis partium morbis et præsertim apoplexiæ, vel hemiplegiæ ansam facile præbent.

SECT.

SECT. III.

De Causa Proxima.

QUAEDAM sensorii et nervorum conditio, qua vires eorundem actuosæ vel multum imminuuntur vel prorsus abolentur, hujus morbi causa proxima habenda est.

Hæc morbosa conditio duplici, ut mihi videtur ratione effici potest ; scilicet,

1^{mo}, Pressu præter naturam cerebro, aut nervis illato.

2^{do}, Viribus sedantibus corpori admotis.

Pressuram cerebro illatam, causam morbo concitando parem existere probatur, animum advertendo

tendo ad cerebri conditionem cranii fracturâ inductam. Illustris BOERHAVIUS infigne nobis exemplum tradit quod hanc rem clarissime demonstrat.*

Homini vivo pars cranii sublata fuit, ita ut dura mater in conspectum venerit : pressurâ levi huic duræ matris parti admotâ, tinnitum aurium et scintillas oculis obvolitantes æger cum vertigine percipiebat ; pressurâ majore adhibitâ, obdormiscebat ; et pressu magis adhuc aucto, clarè stertebat : hinc dubitari non potest, quin pressura causa corporis conditione, de qua hic agitur, inducendæ par existat.

Cerebri pressura apoplexiam vel hemiplegiam efficiens ad quatuor fontes referri potest, hi sunt.

1mo, Vis externa cranii partem deprimens.

E

2do

* Prælect. vol. ii. p. 659.

2do, Tumores intra cranium generati.

3tio, Vis sanguinis cerebri vasa distendens.

4to, Sanguinis aut feri effusio intra cranium.

De duabus posterioribus causis tantum agemus;
duæ enim priores chirurgi concredendæ sunt.

De modo, quo hæ causæ morbum proximè excitant, variè inter varios *pathologos* disputatum est.

Creditum est, et adhuc creditur, fluida in cerebri ventriculos, vel alias cerebri partes, effusa, in primo casu, et vim sanguinis vasa distendentem in secundo, morbum concitare, cerebrum comprimendo, hoc est, in spatium minus evidenter coarctando; et quod hinc consequens est, vasa ipsa, haud amplius solito more sustentata, distendi.

Celeberrimus autem Professor MONRO negat cerebrum, durante vitâ ita comprimi posse, ut spatium minus manifestè occupet ; vir enim sagax experimento simplice de industria ad hanc litem dirimendam factò, cerebrum in spatium minus coarctatum demonstrari posse, invenit.

Cerebri ovilli portionem infra aquam excisam ampullæ vitræ aquâ prope modum plenæ, eodem loci sitæ indidit ; et in ampullæ cervice locum ad quem aqua assurgebat adamante notavit : deinde vasis collo vesicam aëre distentam firmiter affixit ; quo factò, vesicam insigni vi compressit ; nec tamen aqua vel minimum quidem depressa fuit.

Hoc experimentum, ut opinor, extra omnem dubitationem probat, cerebri substantiam nullâ vi cordis et arteriarum actione illatâ ita comprimi posse, ut spatium evidenter minus occupet.

Hinc fequitur fanguinis quantitatem in capite exiftentem augeri non poffe, ita ut incrementum fenfibus noftris percepi poffit, quamdiu cerebri fubftantia integra, et cranii parietes in ftatu naturali perfifterent, copia licet fanguinis major, quovis dato tempore, ob majorem vaforum actionem per idem tranfeat.

Apoplexia igitur pendere non poteft ex compreffione cerebri molem evidenter imminuente: cùm autem morbum ex preffu cerebro illato oriri pro certo conftat; laticem in ventriculos vel alias cerebri partes effufum, et vaforum conditionem nullo alio operandi modo evidenti morbum inducere concludamus oportet.

2do, Causa apoplexiæ proxima viribus fedantibus corpori admotis induci poteft.

Hujusmodi causæ funt vapores *hydrargyri*, plumbum, aliaque venena metallica; opium, alcohol

cohol et multa alia *narcotia*: *gas acidum carbonicum*, aliique vapores *mephitici*: quibus annumerari possunt vires frigoris sedantes, cerebri concussio, ictus electrici, et quidam animi affectus: et inter has pathemata deprimentia, quorum nonnulla morbum recté inducunt.

Has, et hujusmodi causas, apoplexiam concitare minime dubitari potest; quali autem modo in cerebrum, et nervos, agant, qualesve sint mutationes, quæ efficiuntur, ignorare me fateor.

SECT.

SECT. IV.

De Morbi Ratione Medendi.

CURATIO ex jam dictis in tria consilia quasi sponte se dividit.

I. MORBO VENIENTI OCCURRERE.

II. PAROXYSMUM PRAESENTEM TOLLERE.

III. HEMIPLEGIAM, QUAE CONSEQUITUR, AMOVERE.

PRIMUM CONSILIUM absolvitur vitando causas excitantes, ex quibus periculum præcipue et proxime pendet; et corrigendo proclivitatem, quatenus hoc fociatis regiminis et medicamentorum viribus fieri potest. Horum usus violentia signorum, aegri ætate, corporis habitu, et varia
con-

confuetudine, gubernari, ac moderari, debet : cūque vaforum cerebri plenitudo fit causa prædisponens, ex qua paroxysmus instans præcipue pendet, ad illam tollendam totis viribus incumbere debemus; varia suppetunt remedia, quibus hic finis absolvitur; præcipua sunt sanguinis detractio; medicamenta cathartica; fetacea et fonticuli; tonsura capitis; errhina; dieta; et exercitatio; de quibus paucis sigillatim agemus.

Quamvis nullum sit remedium præsentius aut efficacius ad plenitudinem tollendam quam detractio sanguinis, cum tamen corpus solvit, laxat, et idem malo opportunius reddit pessima ex ejusdem usu timenda, nec unquam in casibus ordinariis adhibendam censemus: in exemplis autem gravioribus, quibus paroxysmus inflat, est certe auxilium, cui soli confidere possumus, cujusque usu tempestivo maximæ aegrotanti sanitatem recuperandi fortes erunt. In exemplis ubi de sanguine detrahendo ancipites hæremus,

hirudines

hirudines temporibus admotæ, vel occipitis scarificationes consilio quam optime responderunt.

Cùm alvi purgatio peculiari in sanguinis cursu a capite avertendo vi pollet, eandem fini nostro bene accommodatam putamus : acriora autem cathartica nunquam nisi in gravioribus exemplis danda sunt ; quia sanguinis cursum nimis festinando plus damni interdum quam boni afferre possunt : mitiora igitur, qualia sunt pulvis jalappæ compositus, et potassa tartarizata anteponenda sensimus ; hujusmodi mitiora, semel septimanâ data, menses, vel etiam annos, præscribi possunt.

Setacea et fonticuli ad generalem corporis plenitudinem minuendam plurimum prodesse possunt ; et posteriori colli parti, si optio nostra fuerit, indenda suaderemus ; Professor GREGORY exemplum tradit hominis, qui magno hujusmo-

di fonte pifi ope copioſe manente, dieta parca, et alvi purgatione, apoplexiæ impetu per plures annos immunis evaſerat.

Tonſura capitis, præſertim ſi caput ſimul frigida ſæpius lavetur, haud aſpernandâ in paroxyſmo arcendo vi pollet.

Errhina ſemper, ni aeger antea eis aſſuetus fuerit, vitari debent : et hic etiam, caute præſcribenda ſunt : copiaque paulatim minuenda eſt, donec tandem ſine periculo penitus ſubduci queant. Sunt qui eadem, ob copioſam muci excretionem, quam efficiunt, capitis vaſorum plenitudinem minuere contendunt : quantum autem hac ratione profunt, tantundem ſanguinis curſum caput verſus per ſtimulum ſuum faciendo, obſunt.

Porro alia ſuppetunt auxilia, quibus teſte experientia, paroxyſmus certius arceri poteſt ; hæc

T

ſunt

sunt diæta parca, et exercitatio idonea peritè ordinatae.

Diaeta omnigena nimis stimulans, quales sunt carnes, quæ per se faciem rubore suffundunt, condimenta, butyrum &c. caute vitanda est; et hujusmodi rerum stimulantium vice, cibus ex frugibus mitioribus paratus concedi debet. Abstinentum est quoque ab omnibus potionibus meracioribus, vino nimirum, et liquoribus spirituosiss, ac fortioribus fermentatis. In omnibus autem casibus cerevicia tenuis, quippe quæ alvum leniter laxat permitti debet, et aquæ anteponenda videtur.

Hæ tamen regulæ aetate provec̃tis et victui pleniori affuetis minus rigidè præcipiendæ sunt; hi enim aegri stimuli soliti imminutionem non sine molestia, vel etiam periculo ferre valent: in hujusmodi igitur casibus, cibus præsertim ex carnibus tantum minuendus est: coenæque ex his paratae

ratae penitus prohibendae sunt. Porro si potioribus meracioribus quotidie affueti fuerint, pauxillum illis concedi debet.

Exercitatio licet omnium remediorum in hoc morbi stadio longe optimum, si tamen nimia fuerit, et praesertim si aegrotans obesior, vel aetate provectior sit; haud raro causa morbi excitans fieri solet; ut supra exposuimus; istiusmodi igitur aegris cautissime administranda est: exercitatio debet esse ea, quae halitui cuticulari sustentando par existit; nec unquam tanta esse debet, ut respirationem acceleret, aut corporis calorem intendat.

Si aegri ad ambulationem non valent, gestatio primo in rhedâ, et postea, quando plus virium habebunt in equo sedulo usurpanda est: nec raro post hoc ambulationi pares evadent. Exercitatio lenis, crebra tamen esse debet, et satis diu adhibita; hoc enim modo sanguinis cursus ad
corporis

corporis superficiem dirigitur ; et plenitudo occurritur.

Una cum his auxiliis justus frigoris gradus proderit : aegerque capite solito altiore dormire debebit.

II. PAROXYSMUM PRÆSENTEM TOLLERE.

Paroxyfmo aſtante, aegro veſtes ſtatim exuendæ ſunt ; et fenestris &c. apertis in aëre frigido, et ſitu erecto, collocari debet ; interea cavendum ne hominum turba, quippe quæ aërem corrumpit, et calefacit, circa aegrum congregetur ; quo facto, varia auxilia ad preſſuram cerebro illatam, ſanguinis nimirum detractio, medicamenta cathartica, emetica, et exulcerantia, ſtatim adhibenda ſunt.

Sanguinis detractio in omni apoplexiæ vel hemiplegiæ exemplo, quod ex hydropiſi, vel ex potentiis ſedantibus non evidenter pendet, ſta-

tim

tiin ufurpanda est : et consuetudo fuit sanguinem mittere ex venis jugularibus, vel si hoc frustra tentatur, ex arteriis temporalibus, vel denique, si hæc pertundi non possunt, quævis corporis vena statim incidi debet. Haec exinanitio, corpore erecto, quippe quod consilium nostrum manifestè adjuvabit, perficienda est : sanguisque prima vice, ad uncias sexdecim, vel viginti mittatur oportet.

Interea detractio sanguinis topica minime negligenda est ; hæc vel hirudinibus occipiti admotis, vel scarificatione, vel denique cucurbitulis cum ferro fieri potest ; hæc autem, quippe qua sanguis citius detrahitur, anteponenda est. Nonnulli, uno corporis latere gravius affecto, sanguinis ex latere contrario detractionem plus profuturam crediderunt. Omnibus his modis sanguinis detractio non solum generalem corporis plenitudinem, sed etiam, quod hinc consequens est, impetum ejusdem cerebrum versus statim imminuet.

Alvi

Alvi purgatio semper cum sanguinis detractio-
ne conjungi debet : et eandem inter prima re-
media huic malo accommodata existere, ex ante-
a expositis facile constabit : si devorandi vis su-
perfit, cathartica ore dari oportent : sin minus, e-
nemata acria injicienda sunt.

Vomitio præterquam in casibus, qui ex nimia
ventriculi distentione pendent, nunquam, astan-
te paroxysmo, permitti debet : quia vomendi
actione facies non solum plenis tumescit, et rubore
suffunditur ; sed etiam oculi lacrymas effundunt,
et sanguine turgidi fiunt, et scintillæ sæpe ipsis ob-
volitant ; aegerque ob sanguinis impetum in ce-
rebro auctum vertigine corripitur : et respira-
tione per vomendi actionem impedita, latus cor-
dis dextrum se facile deplere non valet : et hinc
venæ, quæ sanguinem ex capite reducant, tur-
gescunt.

Medicamenta exulceratoria cum maximo com-
modo,

modo, præfertim partibus capiti vicinis, posteriori nimirum colli parti, vel pone aures imponi possunt; cursum sanguinis a partibus internis ad externas faciendo prodesse videntur.

Si morbus ex diathesi hydropica oriatur, medicamentis catharticis, et exulceratoriis, optime tractabitur.

Si apoplexiæ insultus potestates sedantes causam agnoscat, morbus principiis diversis ab his de quibus supra egimus, curandus est.

Quando venenum, quod morbum excitat, recens in ventriculum recipitur, vomitum interdum cito efficiet: hic vomitus promoveri debet; quando autem venenum vomitionem non ciet, vomitoria, quæ subito operantur, Zinci nimirum *sulphas*, &c. statim adhibenda sunt. Contra autem, si venena diu in ventriculo, nulla vomitione excita, permanferint; nihil commodi ex emeticorum usu percipi potest:

potest: cùmque nulla sit ratio, cur cerebrum in hujusmodi exemplis, sanguinis circuitus premi credamus, hoc tantùm annitendum ut æger aëre frigido, aliisque stimulantibus, quorum præcipuum videtur frigida, faciei aliive corporis parti, effusa, excitetur.

III. HEMIPLEGIAM, QUÆ CONSEQUITUR, AMOVERE.

Si paroxysmus hemiplegiæ formâ adortur, mendendi ratio, ideo quod causæ sunt eadem ac in apoplexia idiopathica, prorsus eadem sit oportet: et quando hemiplegia apoplexiæ supervenit, est cur cerebri pressuram in aliquod tempus postea superesse credamus. Hoc clarius patebit ex CULLENI verbis, ubi dicit, “ Where a fit of apoplexy has gone off, and there appears a state of palsy appearing as a partial affection only, it might perhaps be supposed that the origin of the nerves is in a great measure relieved; but in

“ in so far as commonly there still remain the
 “ symptoms of the loss of memory, and of some de-
 “ degree of fatuity, these, I think, shew that the or-
 “ gan of intellect, or the common origin of the
 “ nerves, is still considerably affected.”*

Quamdiu igitur hæc signa perstant in eadem
 medendi ratione, quam in apoplexia commenda-
 vimus, plus minus strenue adhibitâ prout signa
 postulaverint, perstandum erit.

Ratio autem medendi omnino diversa sit oportet ;

1mo, Quando morbus in tempus insigne protrahitur.

2do, Cum signa cerebri pressuram indicantia, tolerantur.

G.

3tio

* First Lines of the Practice of Physic, 1145.

3^{to}, Quando malum ex sedantibus oriri cognoscetur.

In huiusmodi enim exemplis pressuram cerebro sublataam ponimus; dum læsio sola persistat: quod optime illustratur tali cuiusvis nervi pressurâ, qualis dotes ejusdem naturales non perdit: tunc enim in parte, in quam nervus diffunditur, torpor sentitur, qui quamdiu pressura adhibetur, augeri persistat: hic autem effectus, pressura sublata, non tollitur, sed paulatim minuitur, donec partes tandem ad functiones naturales restituantur. In istiusmodi igitur casibus remedia, quæ commendari solent, sunt stimulantia, eaque præfertim, quæ in systema nervosum solum agunt. Cum autem morbi ad redeundum proclivitas semper plus minus præceps sit, ad hanc, inter stimulantia danda, animus sedulo adverti debet. Hæc stimulantia sunt vel interna vel externa.

Externa

Externa.---Magna horum varietas commendata fuit : sequentia autem præcipua videntur : aqua nimirum *ammoniacæ* causticæ oleis conjuncta : hujusmodi præparata, partes quibus admoventur, insigniter calefaciunt; *ammonia* pariter errhinum præscribi potest. Horum autem medicamentorum princeps est sinapi, eidemque maxime fidendum est; cavendum autem ne partes exulceret. His conjungi possunt cantharides, ita tamen ut cuticula in vesiculas non turgeat : spiritus vinosus *camphoratus* ; urticarum punctio ; frictio vel strigili, vel panno laneo ; et calor.

Quando morbus ex viribus sedantibus oritur, frigus frigidarii forma præscribi debet : hoc autem in tempus breve tantum, ususque ejus effectibus, quos ederit, gubernandus est.

Aura electrica apud quosdam in pretio habetur : hujus autem usus admodum anceps videtur, rarsa enim stimulando morbum reducere potest.

Exercitatio denique nunquam omitti debet; namque veluti fama, aegrotus hoc malo laborans.

“Mobilitate viget, viresque acquirit eundo.”*

Cæterisque omnibus longè gestatio eminet; non solum quia aeger viribus propriis se exercere nequit; sed etiam quia stimulus virium quæ in gestatione exercentur, mediocris, et idcirco tutus, existit.

Præter hæc autem animus ad partem affectam nunquam non adverti debet; hæc sæpius movenda est: si aegrotans ad hunc motum non valet; nihilo tamen minus moliendum est: quia nullus licet motus sequatur; actio tamen voluntatis inter stimulos efficacissimos, et maxime naturales, qui adhiberi possunt, existit.

Interna.---*Carbonas ammoniæ* dari solet; huius autem medicamenti effectus plerumque parum efficax comperietur. Fruges ex classe *Tradynamia*

* Virg.

tradynamiâ plura, medicamenta stimulantia, interna, quæ cum felici interdum exitu dantur, nobis suppeditant, et hujus classis instar omnium sunt sinapis femina integra data. Varia aromata commendata fuerunt: cùm hæc autem insigni in systemate vasculoso vi agunt, omittenda videntur. *Guajacum*, *terebenthina*, variaque medicamenta foetida subinde data fuerunt, his autem fidere nolumus. *Cinchona officinalis* et ferrum eodem consilio, sed frustra, administrata fuerunt.

Denique quod omnium horum stimulantium interiorum usum attinet, eundem semper suspectum habere debemus: summiâ semper prudentiâ danda sunt: incauté enim adhibita tantum abest ut profint, ut morbum nonnunquam concitent.

C O R R I G E N D A.

Pag. 2. lin. 1. *pro* veniente *lege* venienti.

6. — 10. *pro* hemephlegia *lege* hemiplegia.

-- — 14. *pro* necququam *lege* nequicquam.

7. — 12. *dele* (,)

-- — 19. *pro* concitatur *lege* comitatur.

8. — 14. *pro* descenderit *lege* descenderat.

12. — 12. *post* ralyfi *adde* laud.

16. — 3. *pro* occidere *lege* accidere.

18. --- 19. *pro* tandem *lege* tantum.

21. --- 7. *pro* ceteraque *lege* cæteraque.

22. --- 3. *pro* ignarum *lege* ignavum.

--- --- 19. *pro* obnoxiam *lege* obnoxium.

25. --- 14. *pro* concitarent *lege* concitarunt.

26. --- 2. *pro* offundit puero *lege* offundit ; puero.

30. --- 8 et 11. *pro* cæli *lege* cœli.

36. --- 5. *pro* perstiterent *lege* perstiterint.

40. --- 12. *pro* sensemus *lege* censemus.

41. --- 1. *pro* manente *lege* manante.

--- --- -- *pro* dieta *lege* diæta.

46. --- 5. *pro* oportent *lege* debent.

47. --- 17. *pro* excita *lege* excitata.

48. --- 6. *pro* effusa *lege* affusa.

CONTENTS

1	THE HISTORY OF THE	
2	3	4
5	6	7
8	9	10
11	12	13
14	15	16
17	18	19
20	21	22
23	24	25
26	27	28
29	30	31
32	33	34
35	36	37
38	39	40
41	42	43
44	45	46
47	48	49
50	51	52
53	54	55
56	57	58
59	60	61
62	63	64
65	66	67
68	69	70
71	72	73
74	75	76
77	78	79
80	81	82
83	84	85
86	87	88
89	90	91
92	93	94
95	96	97
98	99	100



